

Dolamin®

clonixinato de lisina

125 mg

Forma farmacêutica e apresentação

Comprimidos revestidos - Embalagem com 16 comprimidos

USO ADULTO

VIA ORAL

Composição

Cada comprimido revestido contém:

clonixinato de lisina 125 mg;

excipientes q.s.p.....1 comprimido

(manitol, gelatina em pó , amido de milho, polietilenoglicol, água purificada, celulose microcristalina, estearato de magnésio, álcool isopropílico, cloreto de metileno, talco, hipromelose, dióxido de titânio e triacetina)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação do medicamento

Dolamin® possui potente ação analgésica e ações anti-inflamatória e antipirética moderadas.

Seu tempo de absorção é em torno de 10 minutos após a administração.

Indicação do medicamento

Dolamin® é indicado para o tratamento da dor, seja esta o sintoma principal ou secundário, podendo ser administrado para o alívio das dores de cabeça, musculares, articulares, pós-traumáticas (fraturas, artroses, e rupturas musculares), pós-cirúrgicas e cólicas dolorosas.

Riscos do medicamento

Contraindicações

- Em pacientes com antecedentes de asma ou espasmo dos brônquios, pólipos nasais, reações alérgicas ou urticária induzidos pela administração de ácido acetilsalicílico (aspirina) ou outros anti-inflamatórios não esteróides.

Em pacientes portadores de úlcera péptica ativa ou hemorragia digestiva.

Gravidez

Lactação

Pacientes menores de 10 anos.

- Hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 10 ANOS.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA.

INFORME SEU MÉDICO DA OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS SEU TÉRMINO.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO DURANTE A AMAMENTAÇÃO.

INFORME SEU MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.

Precauções e advertências

Dolamin[®] deve ser administrado com cautela e em dosagens reduzidas em pacientes idosos, já que a incidência de reações adversas a anti-inflamatórios não esteroidais aumenta com a idade.

Evitar a ingestão de álcool durante o tratamento.

Interações medicamentosas

Dolamin[®] pode potencializar o efeito dos anticoagulantes.

INFORME SEU MÉDICO DO APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

INFORME SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

Modo de uso

Aspecto físico

Comprimidos redondos, convexos de cor branca.

Características organolépticas

Comprimidos sem odor ou gosto característico

Posologia

Em adultos e crianças maiores de 10 anos, as doses podem ser ajustadas de acordo com a intensidade da dor.

Dor intensa - tomar dois comprimidos de oito em oito horas ou dois comprimidos juntos, inicialmente, seguidos de um comprimido a cada seis horas.

Dor moderada ou leve - um comprimido, podendo ser repetido a intervalos regulares de seis horas.

Os comprimidos devem ser tomados inteiros, sem mastigar e com líquidos.

A dose máxima diária é de seis comprimidos.

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE SEU MÉDICO, RESPEITANDO OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.

NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

ESTE MEDICAMENTO NÃO PODE SER PARTIDO OU MASTIGADO.

Reações adversas

Dolamin[®] pode causar inchaço, pressão arterial baixa, suor excessivo, irritação da pele, urticária, coceira, ondas de calor, azia, náusea, desconforto abdominal, dor na região do estômago, diarreia, vômitos, boca seca, tontura, dor de cabeça, sonolência, tremor, estado de euforia, fadiga ou sintomas gripais e hemorragia digestiva.

Conduta em caso de superdosagem

- Em caso de superdosagem, os sintomas gastrointestinais são os mais comuns e consistem em ardor e dor epigástrica, náuseas e vômitos. Podem aparecer enjôo, sonolência, insônia, zumbidos e cefaléia.

Estas manifestações aparecem entre uma a duas horas depois da ingestão de Dolamin[®], quando são atingidos os níveis sanguíneos máximos da droga.

- Em caso de superdosagem, deve-se procurar orientação médica para que sejam tomadas as medidas necessárias.

Cuidados de conservação e uso

Cuidados de conservação

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) em sua embalagem original, protegido da luz e da umidade.

Prazo de validade

36 meses após a data de fabricação impressa no cartucho.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

M.S: 1.0390.0139

Farm. Resp:

Dra. Márcia Weiss I. Campos

CRF-RJ nº 4499



Fabricado e distribuído por:

FARMOQUÍMICA S/A

Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 33.349.473/0003-10

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Número do lote, data de fabricação, e prazo de validade: vide cartucho.

