

ação corticotropinométrica dos salicilatos, isto é, a excitação da neuro-hipófise. A cafeína, na dose em que é encontrada no produto, exerce ação produtora do estímulo dos centros psíquicos, equilibrando as propriedades terapêuticas do fármaco.

Indicações: analgésico e antitérmico.

Contra-indicações: O ÁCIDO ACETILSALICÍLICO NÃO DEVE SER EMPREGADO EM PACIENTES PREDISPOSTOS A DISPEPSIAS, OU SABIDAMENTE PORTADORES DE ALGUMA LESÃO DA MUCOSA GÁSTRICA. NÃO DEVE SER ADMINISTRADO A PACIENTES COM INTOLERÂNCIA GÁSTRICA AO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. A PORTADORES DE LESÃO HEPÁTICA GRAVE E A PACIENTES HEMOFÍLICOS, DEVE-SE TOMAR CUIDADO EM PACIENTES COM FUNÇÃO RENAL COMPROMETIDA E PARTICULARMENTE EM CRIANÇAS, QUANDO O PACIENTE ESTÁ DESIDRATADO, COMO TODO MEDICAMENTO. O ÁCIDO ACETILSALICÍLICO É ABSOLUTAMENTE CONTRA-INDICADO NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DE GRAVIDEZ E, APOS ESSE PERÍODO, SÓ DEVE SER EMPREGADO NOS CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE E SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. NO CASO PARTICULAR DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, QUE DEVIDO A VÁRIOS MECANISMOS PROLONGA O TEMPO DE SANGRAMENTO, A SUA ATIVIDADE E UTILIZAÇÃO É CONTRA-INDICADA EM GRAVIDAS NO FIM DA GESTAÇÃO, BEM COMO A HEMOFÍLICOS, PELO MESMO MOTIVO. A TERAPIA COM O ÁCIDO ACETILSALICÍLICO DEVERA SER SUSPensa, NO MÍNIMO, 2 SEMANAS ANTES DE CIRURGIAS.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS: ALGUNS EFEITOS DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO PODEM SER POTENCIALIZADOS PELO ALCOOL, PODE SER AUMENTADA A ATIVIDADE DOS ANTICOAGULANTES CUMARÍNICOS E DAS SULFONILUREIAS, HIPOGLICEMIANTE, OS ANTICOAGULANTES PODEM ACENTUAR O EFEITO HEMORRÁGICO DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO SOBRE A MUCOSA GÁSTRICA. A ATIVIDADE DO METOTREXATO PODE SER ACENTUADAMENTE AUMENTADA, BEM COMO SUA TOXICIDADE. DIMINUI O EFEITO DOS URICOSÚRICOS COMO PROBENECIDA E SULFINPIRAZONA, BARBITURATOS E OUTROS SEDATIVOS PODEM MASCARAR OS SINTOMAS RESPIRATORIOS DA SUPERDOSAGEM COM O ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. NÃO SE RECOMENDA O USO EM CRIANÇAS ABAIXO DE 1 ANO. CRIANÇAS OU ADOLESCENTES NÃO DEVEM USAR ESTE MEDICAMENTO PARA CATAPORA OU SINTOMAS GRIPAIS ANTES QUE UM MÉDICO SEJA CONSULTADO SOBRE A "SÍNDROME DE REYE," UMA RARA, MAS GRAVE DOENÇA ASSOCIADA A ESSE MEDICAMENTO.

Interações medicamentosas: ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS: É POSSÍVEL A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E LESÃO DA MUCOSA GASTROINTESTINAL, COM PERDA DE SANGUE ASSINTOMÁTICA E EM PEQUENAS QUANTIDADES SEM SIGNIFICAÇÃO CLÍNICA. NO ENTANTO, NA TERAPIA A LONGO PRAZO, PODE DESENVOLVER-SE ANEMIA FERROPRIVA. IRRITAÇÃO DA MUCOSA PODE OCORRER MESMO EM DOSES BAIXAS E CAUSAR DISPEPSIAS, EROSÃO, HEMATEMESE E MELENA. PODE OCORRER HIPERSENSIBILIDADE MANIFESTADA PRINCIPALMENTE COMO ASMA (FREQUENTEMENTE ASSOCIADA A PÓLIPOS NASAIS E RINITE, URTICÁRISE E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS, EDEMA ANGIONEURÓTICO, BRONCOSPASMO PAROXÍSTICO COM DISPNEIA), PODEM OCORRER DISCRASIAS SANGUÍNEAS QUE INCLUEM ANEMIA APLÁSICA, AGRANULOCITOSE, GRANULOCITOPENIA E TROMBOCITOPENIA. O USO PROLONGADO DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO EM ALTAS DOSES TEM SIDO ASSOCIADO COM NECROSE PAPILAR RENAL. EVIDÊNCIAS NÃO CONCLUSIVAS RELACIONAM O USO DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COM A "SÍNDROME DE REYE."

Posologia e modo de usar:

Adultos: tomar 1 a 2 comprimidos, de 4 em 4 horas, até 6 comprimidos ao dia.

Superdosagem: NA EVENTUAL SUPERDOSAGEM ACIDENTAL, IMEDIATAMENTE SUSPENDER A MEDICAÇÃO E PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. RECOMENDA-SE TRATAMENTO DE SUPORTE SIMTOMÁTICO.

Pacientes idosos: não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

"SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA."

Venda sem prescrição médica.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide display/blister.

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR
080077-17017 LIGAÇÃO GRATUITA

BRACORSA
INDÚSTRIA
FARMACÉUTICA
S.A.
1996

Reg. MS - 1.2283.0047 - Farmacêutico Responsável: Dr. Carlos Takashi Maki - CRF-SP nº 56906
DM Indústria Farmacêutica Ltda. Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000 - Barueri - SP
CNPJ 67.866.665/0002-34 - Indústria Brasileira - Marca Registrada 3 BDC25-6

doril ácido acetilsalicílico-cafeína

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Comprimido. Display contendo 25 blisteres com 6 comprimidos.

USO ADULTO

Composição: cada comprimido contém:

ácido acetilsalicílico (DCB 0089) 500,0 mg
cafeína (DCB 1642) 30,0 mg
excipiente* q.s.p. 1 comprimido
*amido e corante CI nº 45.430.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE: Ação esperada do medicamento: DORIL atua no alívio da dor e redução da febre. A cafeína confere um alívio também nas dores de cabeça. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas. A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem risco, apenas cessará o efeito terapêutico.

Cuidados de armazenamento: conservar em temperatura ambiente (ambiente com temperatura entre 15 e 30°C) proteger da luz e da umidade.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

Atenção: não use medicamento com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde.

Gravidez e lactação: informe a seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração: siga sempre a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do Tratamento: não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico

REAÇÕES ADVERSAS: EM ALGUNS CASOS, O PRODUTO PODE PRODUZIR, TRANSITÓRIAS NA MAIORIA DAS VEZES, ALGUMAS REAÇÕES DESAGRAVÁVEIS. INFORME A SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRAVÁVEIS.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

Durante o tratamento, recomenda-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

Contra-indicações: O PRODUTO É CONTRA-INDICADO PARA PACIENTES QUE APRESENTAREM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

Precauções: A ADMINISTRAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER CUIDADOSA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, SOB RIGOROSA SUPERVISÃO MÉDICA.

"CRIANÇAS OU ADOLESCENTES NÃO DEVEM USAR ESTE MEDICAMENTO PARA CATAPORA OU SINTOMAS GRIPAIS ANTES QUE UM MÉDICO SEJA CONSULTADO SOBRE A SÍNDROME DE REYE, UMA RARA, MAS GRAVE DOENÇA ASSOCIADA A ESSE MEDICAMENTO."

INFORME A SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INÍCIO, OU DURANTE O TRATAMENTO."

"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE."

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Características químicas e farmacológicas: o mecanismo de ação do produto se deve aos seus constituintes ativos, isto é, o ácido acetilsalicílico e a cafeína. Como analgésico, o ácido acetilsalicílico eleva o limiar doloroso, admitindo-se ainda uma atividade periférica bloqueadora da bradicinina, polipeptídeo considerado o mediador químico da dor. Nas doses normalmente indicadas para o uso do produto, não é comum ser observada