

Incontinol[®]

Oxibutinina

Uso adulto e/ou pediátrico

Forma farmacêutica e apresentações - *Comprimido simples*: Caixa com 20 comprimidos em 2 blisters de 10 unidades. Caixa com 30 comprimidos em 3 blisters de 10 unidades.

Composição - Cada comprimido contém 5,0 mg de cloridrato de oxibutinina. Excipientes: lactose, celulose microcristalina, amido, corante azul brilhante, povidona, talco, estearato de magnésio.

Propriedades - A oxibutinina possui efeito espasmolítico potente sobre a fibra muscular lisa do trato urinário, assim como propriedades anticolinérgicas moderadas. A oxibutinina apresenta poucos efeitos paralelos.

Indicações - Ensaios clínicos utilizando parâmetros clínicos e urodinâmicos determinam a eficácia da oxibutinina em três indicações principais: instabilidade vesical, imaturidade vesical, bexiga neurogênica espástica. Observa-se clara melhora nos transtornos diurnos (polaciúria, urgência miccional, incontinência urinária). Os transtornos noturnos, como enurese e polaciúria, são sensíveis ao tratamento. Observam-se aumento da capacidade vesical, diminuição da amplitude das contrações vesicais e pressão intravesical.

Contraindicações e precauções - A oxibutinina é contraindicada no glaucoma de ângulo fechado, na miastenia *gravis*, obstrução do TGI, distúrbios da motilidade intestinal, uropatia obstrutiva ou com hemorragia e instabilidade do *status* cardiovascular, na hipersensibilidade à oxibutinina ou a qualquer componente da fórmula.

Reações adversas - Secura da boca, diminuição da transpiração, retenção urinária, febre, taquicardia, *flushes*, palpitação, visão borrada, aumento da pressão ocular, ambliopia, vasodilatação, diminuição da produção de lágrima.

Posologia - *Adultos*: 2 a 3 comprimidos ao dia, no máximo 4 comprimidos ao dia. *Crianças acima de 5 anos de idade*: 2 comprimidos ao dia. Recomenda-se iniciar o tratamento com a metade da dose preconizada, em idosos e crianças.

Registro no M.S. 1.0397.0063.

Produtos Farmacêuticos MILLET ROUX Ltda.