

Betacard plus

Atenolol + Clortalidona

Composição - Cada comprimido de BETACARD PLUS 50 mg contém: Atenolol 50 mg; Clortalidona 12,5 mg. Cada comprimido de BETACARD PLUS 100 mg contém: Atenolol 100 mg; Clortalidona 25 mg.

Indicações - Controle da hipertensão.

Contraindicações - Hipersensibilidade ao atenolol, à clortalidona; bradicardia; choque cardiogênico; hipotensão; acidose metabólica; distúrbios graves da circulação arterial periférica; bloqueio cardíaco de II ou III grau; síndrome do nodo sinusal; feocromocitoma não tratado; insuficiência cardíaca descompensada; gravidez ou lactação.

Reações adversas - BETACARD PLUS (atenolol + clortalidona) é bem tolerado. Em estudos clínicos, as possíveis reações adversas relatadas são geralmente atribuíveis às ações farmacológicas dos seus componentes.

Posologia - *Adultos*: 1 comprimido ao dia de BETACARD PLUS 50 mg (atenolol + clortalidona) ou de BETACARD PLUS 100 mg (atenolol + clortalidona), de preferência no mesmo horário todos os dias. A maioria dos pacientes com hipertensão apresentará uma resposta satisfatória com a dose diária de 1 comprimido de BETACARD PLUS 100 mg (atenolol + clortalidona). Há pouca ou nenhuma queda adicional na pressão arterial com o aumento de dose, mas, quando necessário, pode-se adicionar outro agente anti-hipertensivo, tal como um vasodilatador.

Apresentações - BETACARD PLUS 50 mg: Embalagem contendo 30 comprimidos. BETACARD PLUS 100 mg: Embalagem contendo 30 comprimidos.

Registro no M.S. 1.0525.0023.

TORRENT do Brasil Ltda.